Как мы писали ранее проглоченная кошкой шерсть – это серьезная проблема, которая угрожает ее здоровью в целом. В этой части выведение шерсти из ЖКТ кошки, мы расскажем, каким образом животное само избавляется от волосяных комков. Также опишем симптомы, которые возникают у питомца при этом заболевании.

Отметим важный момент сразу, вылизанные кошкой волоски могут накапливаться не только в отделах желудочно-кишечного тракта, но и в ротовой полости за нижними клыками. Разумеется, само достать оттуда шерстинки животное не способно, и здесь ей на помощь должны прийти заботливые хозяева. Иначе волоски могут врасти в десну, а это уже грозит воспалительным процессом.

От комков шерсти, образующихся в желудке, кошка обычно пытается избавиться самостоятельно. Например, животному помогает сухой кашель. Он же способствует вызыванию рвоты, с которой обычно удаляется один комок. Кошка, освободившая желудок от вредоносных комков, чувствует себя естественно намного лучше. Однако есть и минусы, при рвоте (если она обильная и содержит кусочки пищи) кошка теряет жидкость и электролиты, которые необходимо восполнять. И сделать это нужно при помощи специальных препаратов и диеты.

Следующая проблема, которую несут в себе трихобезоары, — искажённый аппетит. С одной стороны, давно пора принять очередную порцию пищи, концентрация глюкозы в крови снизилась, животное чувствует голод. А с другой — забитый комками желудок сигнализирует о том, что он переполнен. И животное не может нормально питаться, не лезет пища — некуда. Вот и мается бедная кошка, жуёт траву в надежде вызвать рвоту.

Образованные в желудке волосяные капсулы могут вызвать у кошки гастрит. Это заболевание характеризуется нарушением основных функций желудка. При остром гастрите кошку мучают частые приступы рвоты и повышенное слюноотделение, беспокоит общая слабость, отсутствие аппетита, а также жидкий стул. Скопления шерсти из желудка кошки далее продвигаются в кишечник, и эго становится причиной запоров. Животное делается вялым и апатичным, отказывается от приема пищи, в результате чего организм истощается, кошка худеет. Кошку мучает рвота, вздутие и болезненность живота, лихорадка. Во время попыток дефекации кошка испытывает напряжение и боль, при этом она может жалобно мяукать.

Запоры, вызванные трихобезоарами, в ряде случаев вызывают непроходимость желудочно-кишечного тракта. Скопившаяся шерсть механически травмирует желудок и кишечник, вызывает спазмы и острое расширение этих органов. Поэтому животному, если его вовремя не прооперировать, грозит летальный исход. Обнаружив недомогание у питомцев, не стоит заниматься самолечением. Оценить истинные причины плохого самочувствия кошки может только ветеринар… Продолжение следует …